



由利組合総合病院 消化器内科



スタッフ

◆ 常勤医4名（日本大学、秋田大学）

- 日本内科学会認定医
- 日本消化器病学会消化器病専門医
- 日本消化器内視鏡学会専門医
- 日本ヘリコバクター学会認定医

◆ 非常勤医

- 秋田大学、秋田組合病院から



診療実績

内視鏡的診断・治療が当科の強みです

◆ 2016年度内視鏡診療実績

- 上部消化管内視鏡検査 3224件
- 下部消化管内視鏡検査 874件
- 上部消化管内視鏡治療 121件
- 下部消化管内視鏡治療 259件
- 内視鏡的逆行性膵胆管造影および治療 128件

診療実績

内視鏡診断・治療が当科の強みです

◆ 内視鏡治療のエキスパートが定期的に来院

- 後藤田卓志先生
日本大学 消化器内科 教授
- 糸井隆夫先生
東京医科大学 消化器内科 教授

2人の詳細は
Wikipediaを!



初期研修医の研修内容

▶ 研修医2年目M先生の一例

	月	火	水	木	金
午前	上部・下部消化管内視鏡検査 ☆鎮静下,入院患者では研修医が施行				
午後	ERCP/PTCD	ESD/EMR 内科外科合同 カンファレンス	ESD/EMR	ERCP/PTCD	



A先生の内視鏡研修

▶ 救急疾患の初期対応・初期治療も研修医が行っています

資格・専門医

◆ 施設認定

- 日本消化器内視鏡学会認定施設
- 日本消化器病学会認定施設



☞ 専門医申請時に研修期間・経験症例数
としてカウントOK！

学術活動

◆ 臨床研究

- 現在進行中の臨床試験および研究 7題

◆ 学会活動

- 海外・国内学会発表 多数

◆ 英文論文（由利組合総合病院にて行った研究内容）

- Severe Acute Cholangitis with Complications of Bacterial Meningitis Associated with Hearing Loss. Intern Med. 2015;54(14):1757-60.
- Feasibility of non-anesthesiologist-administered propofol sedation for emergency endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Gastroenterol Res Pract. 2015;2015:685476.
- Safety of gastroenterologist-guided sedation with propofol for upper gastrointestinal therapeutic endoscopy in elderly patients compared with younger patients. Gut Liver. 2015 Jan;9(1):38-42.
- Randomized controlled trial comparing gastric cancer screening by gastrointestinal X-ray with serology for Helicobacter pylori and pepsinogens followed by gastrointestinal endoscopy. Gastric Cancer. Epub 2014 Aug 13.
- Non-anesthesiologist administrated propofol (NAAP) during endoscopic submucosal dissection for elderly patients with early gastric cancer. Gastric Cancer. 2014 Oct;17(4):686-91.

学術活動の指導も万全！



學術活動

◆ 英文論文 (つづき)

- Novel EUS-guided double-balloon-occluded gastrojejunostomy bypass. *Gastrointest Endosc* 2016;83:227-46.
- Usefulness of a traction method using dental floss and a hemoclip for gastric endoscopic submucosal dissection: a propensity score matching analysis (with videos). *Gastrointest Endosc* 2016;83:337-46.
- The Efficacy and Tolerability of a Triple Therapy Containing a Potassium-Competitive Acid Blocker Compared With a 7-Day PPI-Based Low-Dose Clarithromycin Triple Therapy. *Am J Gastroenterol* 2016;117:949-56.
- Current status of percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) in a general hospital in Japan: a cross-sectional study. *J Rural Med* 2016;11:7-10.
- The administrative project of Helicobacter pylori infection screening among junior high school students in an area of Japan with a high incidence of gastric cancer. *Gastric Cancer* 2017;20:16-19
- Safety of first-line triple therapy with a potassium-competitive acid blocker for Helicobacter pylori eradication in children. *J Gastroenterol* 2017
- Width and depth of resection for small colorectal polyps: hot versus cold snare polypectomy. *Gaastrointest Endosc* 2017